

XP ± Trastuzumab療法

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日

1. トラスツズマブ: 初回: 8mg/kg 2回目以降: 6mg/kg
 2. CDDP: 80mg/m² CDDPは10mg/m²ずつ減量
 3. カペシタビン: 2000mg/m²/日
 1.36m²未満 1200mg/回 × 2/日
 1.36~1.66未満 1500mg/回 × 2/日
 1.66~1.96未満 1800mg/回 × 2/日
 1.96m²以上 2100mg/回 × 2/日


施行回数: コース
 前回実施日:

PS: 0 1 2

投与方法

day1

day2,3



		薬剤名・投与量			薬剤使用量	
day1	①	ソリタ-T3号G 500ml	×	1	B	
		ビカーボン 500ml	×	2	B	
	②	アロカリス 235mg	×	1	V	
		アロキシ 0.75mg デカドロン 9.9mg	×	1	B	6.6mg × 1V 1.65mg × 2A
	③	生食 250ml	×	1	B	抜き取り量: 0.0 cc
		トラスツズマブ	0	mg		150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解) 60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
	④	生食 500ml	×	1	B	抜き取り量: 0 cc
シスプラチン		0	mg		50 mg × 0 V 10 mg × 0 V	
⑤	マンニトールS 300ml	×	1	B		
⑥	生食 500ml	×	2	B		
⑦経口	カペシタビン	0	mg/日		300 mg × 錠/(分2朝・夕) × 14日	
day2,3	①	ソリタ-T3号G 500ml	×	1	B	
		ビカーボン 500ml	×	2	B	
	②	生食 100ml	×	1	B	
デカドロン 6.6mg		×	1	V		
③	ビカーボン 500ml	×	2	B		

カペシタビン: 14日間内服

7日間休薬

