患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

FOLFOXIRI + B-mab療法

1. BV: 5mg/kg
2. l-LV: 200mg/㎡
3. CPT-11: ☐ 165 ☐ 125 ☐ 80mg/㎡
4. L-OHP: ☐ 85 ☐ 65 ☐ 50mg/㎡
5. 5-FU(div): ☐ 3200 ☐ 2400 ☐ 1600mg/㎡

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数: /12コース

前回実施日:

PS: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

投与方法

① ②90・60・30分 ③30分 ④60分 ⑤⑥120分 ⑦46時間 ⑧

＊①:ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ ⑧CVﾛｯｸ

	薬剤名・投与量		薬剤使用量
①	生食 50ml	× 1 B	
②	生食 100ml ベバシズマブ	× 1 B 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ☆初回:90分 2回目:60分 3回目以降:30分
③	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg デカドロン 9.9mg	× 1 V × 1 B	6.6mg × 1 V 1.65mg × 2A
④	5%ブドウ糖液 250ml イリノテカン	× 1 B 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml レボホリナート	× 1 B 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑥	5%ブドウ糖液 250ml オキサリプラチン	× 1 B 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑦ ポンプ 全量95ml	5-FU 生食 100ml	0 mg × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V 250 mg × 0 V
⑧	生食シリンジ	× 1 筒