

患者ID

&tagPatNo&

氏名

&tagPatKanaName&

生年月日

&tagPatBirth&

年齢

&tagPatage&

性別

&tagPatSex&

身長

&tagPatHeight&

体重

&tagPatWeight&

体表面積

#VALUE!

FOLFIRI + Ramucirumab療法

1. ラムシルマブ:

☐

8mg/kg

☐

1段階減量:6mg/kg

2. I-LV:

200mg/m²

3. CPT-11:

☐

150

☐

120

☐

100mg/m²

4. 5-FU(bolus):

☐

400

☐

300

☐

200mg/m²

5. 5-FU(div):

☐

2400

☐

2000

☐

1600mg/m²

主治医

&tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数:

コース

前回実施日:

PS:

☐

0

☐

1

☐

2

投与方法

①30分

②

③初回60分/2回目以降30分投与

④

⑤⑥120分

⑦15

⑧46時間

⑨

*②、④:フラッシュ

⑨CVロック

	薬剤名・投与量		薬剤使用量	
①	アロカリス 235mg	× 1 V	1.65 mg × 2 V	
	アロキシ 0.75mg	× 1 B		
	デカドロン 3.3mg			
②	生食 50ml	× 1 B		
③	生食 250ml	× 1 B	抜き取り量:	0.0 cc
	ラムシルマブ	0 mg	500 mg ×	0 V
	☆フィルターを使用すること！		100 mg ×	0 V
④	生食 50ml	× 1 B		
⑤	5%ブドウ糖液 250ml	× 1 B	100 mg ×	0 V
	レボホリナート	0 mg	25 mg ×	0 V
⑥	5%ブドウ糖液 250ml	× 1 B	抜き取り量:	0.0 cc
	イリノテカン	0 mg	100 mg ×	0 V
			40 mg ×	0 V
⑦	生食 50ml	× 1 B	抜き取り量:	0.0 cc
	5-FU	0 mg	250 mg ×	0 V
⑧ポンプ 全量95ml	5-FU	0 mg	抜き取り量:	0.0 cc 生食 0.0 cc
	生食 100ml	× 1 B	1000 mg ×	0 V
			250 mg ×	0 V
⑨	生食シリンジ	× 1 筒		

