

患者ID

&tagPatNo&

氏名

&tagPatKanaName&

生年月日

&tagPatBirth&

年齢

&tagPatage&

性別

&tagPatSex&

身長

&tagPatHeight&

体重

&tagPatWeight&

体表面積

#VALUE!

CAPIRI + BV療法

1. BV: 7.5mg/kg

2

☐ CPT-11(多型-)

☐ 200

☐ 150

☐ 125mg/m²

☐ CPT-11(多型+)

☐ 150

☐ 125

☐ 100mg/m²

3. カペシタビン:

1.31m²未満

☐ 900mg/回 × 2/

1.31～1.69m²

☐ 1200mg/回 × 2/

1.69～2.07m²

☐ 1500mg/回 × 2/

2.07m²以上

☐ 1800mg/回 × 2/

減量時

☐ 600

☐ 900

☐ 1200

☐ 1500mg/回

主治医

&tagPatOrdDoc&

施行開始日

施行回数:

コース

前回実施日:

PS:

☐ 0

☐ 1

☐ 2

投与方法

①30分

②90・60・30分

③

④90分

⑤

⑥経口: day1タ～14日間内服

*③、⑤:フラッシュ

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 V
②	生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ☆初回:90分 2回目:60分 3回目以降:30分
③	生食 50ml × 1 B	
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B イリノテカン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 40 mg × 0 V
⑤	生食 50ml × 1 B	
⑥経口	カペシタビン錠 300mg 0 mg/日	0 錠/(分2朝・タ) × 14日

