

|      |                  |
|------|------------------|
| 患者ID | &tagPatNo&       |
| 氏名   | &tagPatKanaName& |
| 生年月日 | &tagPatBirth&    |
| 年齢   | &tagPatAge&      |
| 性別   | &tagPatSex&      |
| 身長   | &tagPatHeight&   |
| 体重   | &tagPatWeight&   |
| 体表面積 | #VALUE!          |

# mFOLFOX6 + Panitumumab療法

1. パニツムマブ  初回: 6. 0mg/kg  
 1段階減量: 4. 8mg/kg  2段階減量: 3. 6mg/kg
2. I-LV: 200mg/m<sup>2</sup>
3. L-OHP:  85  65  50mg/m<sup>2</sup>
4. 5-FU(bolus):  400  200mg/m<sup>2</sup>
5. 5-FU(div):  2400  2000  1600mg/m<sup>2</sup>

主治医 &tagPatOrdDoc&  
 施行開始日: \_\_\_\_\_

施行回数: \_\_\_\_\_  
 前回実施日: \_\_\_\_\_  
 PS:  0  1  2

## 投与方法



\*①:プライミング ⑨CVロック

|                | 薬剤名・投与量   | 薬剤使用量  |
|----------------|---|--|
| ①              | 生食 50ml × 1 B   |  |
| ②              | 生食 100ml × 1 B<br>パニツムマブ 0 mg                         | 抜き取り量: 0.0 cc<br>400 mg × 0 V<br>100 mg × 0 V<br>☆インラインフィルターを使用すること! |
| ③              | 生食 100ml × 1 B  | ☆初回は60分観察。異常無ければ2回目以降はフラッシュで   |
| ④              | アロカリス 235mg × 1 V<br>アロキシ 0.75mg × 1 B<br>デカドロン 3.3mg | 1.65 mg × 2 V  |
| ⑤              | 5%ブドウ糖液 250ml × 1 B<br>レボホリナート 0 mg                   | 100 mg × 0 V<br>25 mg × 0 V  |
| ⑥              | 5%ブドウ糖液 250ml × 1 B<br>オキサリプラチン 0 mg                  | 抜き取り量: 0.0 cc<br>100 mg × 0 V<br>50 mg × 0 V                         |
| ⑦              | 生食 50ml × 1 B<br>5-FU 0 mg                            | 抜き取り量: 0.0 cc<br>250 mg × 0 V  |
| ⑧ポンプ<br>全量95ml | 5-FU 0 mg<br>生食 100ml × 1 B                           | 抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc<br>1000 mg × 0 V<br>250 mg × 0 V             |
| ⑨              | 生食シリンジ × 1 筒  |  |

