

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

CDDP+5FU
【ポンプ】

1. CDDP:	80mg/m ²	
2. 5FU:	800mg/m ²	
☐ 100	☐ 80	☐ 75%dose
☐	%dose	

主治医	&tagPatOrdDoc&
施行開始日	

施行回数:		コース
前回実施日:		
PS:	☐ 0	☐ 1 ☐ 2

投与方法 day1

①ソリタT3G、ビカーボンバッグに混注し、6時間かけて

☆5FUは24時間×5日間継続

②30分 ③120分 ④45分 ⑤4時間

①30分 ②6時間かけて

		薬剤名・投与量	薬剤使用量
Day1	①メイン	ソリタT3号G輸液500ml × 1 B ビカーボン輸液500ml × 2 袋 ☆5FUはポンプ(全量240mL)で24時間×5日間 5FU 0 mg 生食250ml × 1 B	ソリタT3G、ビカーボンはバッグに混注し、6時間かけて投与 抜き取り量: 0.0 cc 1000 mg × 0 V 生食: 240.0 cc
	②側管	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ点滴静注バッグ0.75mg × 1 キット デカドロン9.9mg	6.6mg × 1 V 1.65mg × 2A
	③側管	生食500ml × 1 B シスプラチン 0 mg	抜き取り量: 0 cc 50 mg × 0 V 10 mg × 0 V
	④側管	マンニトールS注射液300ml × 1 瓶	
	⑤側管	生食500ml × 2 B	
Day2,3 4, 5	①側管	生食100ml × 1 B デカドロン6.6mg × 1 V	
	②側管	ソリタT3号G500ml × 1 B ビカーボン輸液500ml × 2 袋	バッグに混注し、6時間かけて投与

