			-				
患者ID	&tagPatNo&		SOX + Trastuzumab療法				
氏名	&tagPatKanaName&			SUA	TITAS	luzuma	D尔江
生年月日	&tagPatBirth&						
年齢	&tagPatage&		1. トラス	.ツズマブ:	□ 初回 8	8mg/kg	2回目以降 6mg/kg
性別	&tagPatSex&				(4週以	上あいた際	は初回投与量で投与)
身長	&tagPatHeight&		2. L-OH	IP:	130	_ 100 _	75 50mg/m <sup>2</sup>
体重	&tagPatWeight&		3. S-1:				
体表面積	#VALUE!		1.25r	m゚未満	_ 40	30	□ 25mg/回×2/日
			1.25	~1.5未満	<u> </u>	40	□ 30mg/回×2/日
主治医	&tagPatOrdDoc&		1.5 <b>m</b>	·以上	<u> </u>	<u> </u>	□ 40mg/回×2/日
施行開始日							
投与方法			施行回数∶ 前回実施 F PS: □		_	コー	ス
					∃: ○ □	1 2	
1)204			<b>1</b>	$\overline{}$			
①30分	②初回90分以降30分割	こで短袖り	3 4	120分	_	口:day1夕~	
		*3、⑤: フラッシュ					
	T	<del></del>		1			<u> </u>
	薬剤名・投	 :与量			薬剤使用		. —
	薬剤名・投 アロカリス 235mg		V				
1		× 1	V B				
1	アロカリス 235mg	× 1 × 1		1.65 r			
1	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg	× 1 × 1 × 1	В	1.65 r 抜き取り量	薬剤使用 mg ×	量	
1	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg デカドロン 3.3mg	× 1 × 1 × 1 × 1	B V	抜き取り量	薬剤使用 mg ×	3量 2 A	(7.2cc/Vで溶解)
	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg デカドロン 3.3mg 生食 250ml	× 1 × 1 × 1 × 1	B V B	抜き取り量 150 r	薬剤使用 mg × ::	2 A 0.0 cc	
	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg デカドロン 3.3mg 生食 250ml	× 1 × 1 × 1 × 1 0	B V B	抜き取り量 150 r	薬剤使用 mg × ∷ mg ×	2 A 0.0 cc 0 V	(7.2cc/Vで溶解)
2	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg デカドロン 3.3mg 生食 250ml トラスツズマブ	× 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	B V B mg	抜き取り量 150 r	薬剤使用 mg × : mg × mg ×	2 A 0.0 cc 0 V	(7.2cc/Vで溶解)
2	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg デカドロン 3.3mg 生食 250ml トラスツズマブ 生食 50ml	× 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	B V B mg	抜き取り量 150 r 60 r 抜き取り量	薬剤使用 mg × : mg × mg ×	2 A 0.0 cc 0 V 0 V	(7.2cc/Vで溶解)
② ③	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg デカドロン 3.3mg 生食 250ml トラスツズマブ 生食 50ml 5%ブドウ糖 250ml	× 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	B V B mg B B	抜き取り量 150 r 60 r 抜き取り量 100 r	平剤使用mg × : mg × mg × : :	2 A 0.0 cc 0 V 0 V 0.0 cc	(7.2cc/Vで溶解)
② ③	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg デカドロン 3.3mg 生食 250ml トラスツズマブ 生食 50ml 5%ブドウ糖 250ml	× 1 × 1 × 1 × 1 × 1 0 0	B V B mg B B	抜き取り量 150 r 60 r 抜き取り量 100 r	平剤使用mg × mg ×	2 A 0.0 cc 0 V 0 V 0.0 cc 0 V	(7.2cc/Vで溶解)
② ③ ④	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg デカドロン 3.3mg 生食 250ml トラスツズマブ 生食 50ml 5%ブドウ糖 250ml オキサリプラチン	× 1 × 1 × 1 × 1 × 1 0 0	B V B mg B B mg	抜き取り量 150 r 60 r 抜き取り量 100 r	平剤使用mg × mg ×	2 A 0.0 cc 0 V 0 V 0.0 cc 0 V	(7.2cc/Vで溶解)

20 mg

0 錠/(分2朝·夕)×14日

