

| | |
|------|------------------|
| 患者ID | &tagPatNo& |
| 氏名 | &tagPatKanaName& |
| 生年月日 | &tagPatBirth& |
| 年齢 | &tagPatAge& |
| 性別 | &tagPatSex& |
| 身長 | &tagPatHeight& |
| 体重 | &tagPatWeight& |
| 体表面積 | #VALUE! |

mFOLFOX6 + BV療法

1. BV: 5mg/kg 10mg/kg
2. I-LV: 200mg/m²
3. L-OHP: 85 65 50mg/m²
4. 5-FU(bolus): 400 300 200mg/m²
5. 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&


施行開始日: _____

施行回数: _____ コース

前回実施日: _____

PS: 0 1 2

投与方法



*③:フラッシュ ⑧CVロック

| | 薬剤名・投与量 | 薬剤使用量 |
|-----------------|---|--|
| ① | アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 3.3mg | 1.65 mg × 2 V |
| ② | 生食 100ml × 1 B ベバシズマブ 0 mg | 抜き取り量: 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ★初回:90分 2回目:60分 3回目以降:30分 |
| ③ | 生食 50ml × 1 B | |
| ④ | 5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg | 100 mg × 0 V 25 mg × 0 V |
| ⑤ | 5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg | 抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V |
| ⑥ | 生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg | 抜き取り量: 0.0 cc 1000 mg × 0 V |
| ⑦ポンプ 全量120ml | 5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B | 抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V |
| ⑧ | 生食シリンジ × 1 筒 | |

