

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

# mFOLFOX6 + Cetuximab

1. セツキシマブ  初回: 400mg/m<sup>2</sup>  2回目以降: 250mg/m<sup>2</sup>
2. I-LV: 200mg/m<sup>2</sup>
3. L-OHP:  85  65  50mg/m<sup>2</sup>
4. 5-FU(bolus):  400  300  200mg/m<sup>2</sup>
5. 5-FU(div):  2400  2000  1600mg/m<sup>2</sup>

主治医 &tagPatOrdDoc&  
 施行開始日: \_\_\_\_\_

施行回数: \_\_\_\_\_ コース \_\_\_\_\_ 回目  
 前回実施日: \_\_\_\_\_  
 PS:  0  1  2

## 投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	<input checked="" type="checkbox"/> アロカリス 235mg・アロキシ 0.75mg デカドロン 9.9mg (6.6mg × 1V, 1.65mg × 2A) <input type="checkbox"/> 生食 100ml デカドロン 19.8mg (6.6mg × 3A) ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	* セツキシマブ単独療法時は生食 100ml、デカドロン19.8mgで
② (初回120分 以降60分)	生食 250ml × 1 B セツキシマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V * 開始から15分間観察すること (infusion reactionに注意)
③	生食 100ml × 1 B	* 初回: 60分、2回目以降: 30分観察
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑦ポンプ 全量120ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

