

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatAge&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!


# mFOLFOX6 + Cetuximab+エンコラフェニブ

- セツキシマブ:  500mg  400mg  300mg/m<sup>2</sup>
- I-LV: 200mg/m<sup>2</sup>
- L-OHP:  85  65  50mg/m<sup>2</sup>
- 5-FU(bolus):  400  300  200mg/m<sup>2</sup>
- 5-FU(div):  2400  2000  1600mg/m<sup>2</sup>
- エンコラフェニブ:  300mg  225mg  150mg/日

主治医 &tagPatOrdDoc&  
 施行開始日: \_\_\_\_\_

施行回数: \_\_\_\_\_ コース  
 前回実施日: \_\_\_\_\_  
 PS:  0  1  2

## 投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロカリス 235mg アロキシ 0.75mg デカドロン 9.9mg ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	6.6mg × 1V      1.65mg × 2V
②	生食 500ml × 1 B セツキシマブ 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V * 開始から15分間観察すること(infusion reactionに注意) * 抜き取り量と同量の母液を先に抜きたる
③	生食 100ml × 1 B	* 少なくとも60分は観察
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B 5-FU 0 mg	抜き取り量: 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑦ポンプ 全量120ml	5-FU 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc 生食 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

エンコラフェニブ: 1日1回連日内服

