

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

mFOLFOX6 + Trastuzumab療法

(トラスツズマブは3週毎に投与)

- トラスツズマブ 初回: 8mg/kg 2回目以降: 6mg/kg
- I-LV: 200mg/m²
- L-OHP: 85 65 50mg/m²
- 5-FU(bolus): 400 300 200mg/m²
- 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日

施行回数: コース
 前回実施日:

PS: 0 1 2

投与方法



①: プライミング ③⑨フラッシュ

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B	
②	生食 250ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc
	トラスツズマブ 0 mg	150 mg × 0 V (7.2cc/Vで溶解)
	蒸留水 20ml × 2 A	60 mg × 0 V (3cc/Vで溶解)
③	生食 50ml × 1 B	
④	アロカリス 235mg × 1 V	
	アロキシ 0.75mg × 1 B	
	デカドロン 3.3mg	1.65 mg × 2 A
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B	100 mg × 0 V
	レボホリナート 0 mg	25 mg × 0 V
⑥	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc
		100 mg × 0 V
	オキサリプラチン 0 mg	50 mg × 0 V
⑦	生食 50ml × 1 B	抜き取り量: 0.0 cc
	5-FU 0 mg	1000 mg × 0 V
⑧ポンプ 全量120ml	5-FU 0 mg	抜き取り量: 5-FU 0.0 cc 生食 0.0 cc
		1000 mg × 0 V
	生食 100ml × 1 B	
⑨	生食シリンジ × 1 筒	

