

mFOLFOX6 + Zolbetuximab療法


患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

主治医 &tagPatOrdDoc&
 施行開始日

1. ゾルベツキシマブ: 初回 800mg/m²
 2回目以降 400mg/m²
2. I-LV: 200mg/m²
3. L-OHP: 85 65 50mg/m²
4. 5-FU(bolus): 400 300 200mg/m²
5. 5-FU(div): 2400 2000 1600mg/m²

施行回数: コース
 前回実施日:
 PS: 0 1 2

投与方法



	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	アロカリス 235mg × 1 V アロキシ 0.75mg × 1 B デカドロン 9.9mg ブスコパン注20mg × 1 A ポララミン 5mg × 1 A	
②	<input type="checkbox"/> 初回 生食 500ml (体表面積 ≥ 1.4) <input type="checkbox"/> 初回 体表面積 < 1.4の場合 生食 250ml <input type="checkbox"/> 2回目以降 生食 250ml (体表面積 ≥ 1.4) <input type="checkbox"/> 2回目以降 体表面積 < 1.4の場合 生食 100ml ゾルベツキシマブ <input type="text"/> 0 mg ☆フィルターを使用すること	ビロイ抜き取り量: <input type="text"/> 0.0 cc 300 mg × 0 V (注射用水15.0cc/Vで溶解) 100 mg × 0 V (注射用水5.0cc/Vで溶解) *ビロイの抜き取り量を母液に追加(水抜き不要)
③	生食 100ml × 1 B	
④	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B レボホリナート <input type="text"/> 0 mg	100 mg × 0 V 25 mg × 0 V
⑤	5%ブドウ糖液 250ml × 1 B オキサリプラチン <input type="text"/> 0 mg	抜き取り量: <input type="text"/> 0.0 cc 100 mg × 0 V 50 mg × 0 V
⑥	生食 50ml × 1 B 5-FU <input type="text"/> 0 mg	抜き取り量: <input type="text"/> 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑦ポンプ 全量120ml	5-FU <input type="text"/> 0 mg 生食 100ml × 1 B	抜き取り量: 5-FU <input type="text"/> 0.0 cc 生食 <input type="text"/> 0.0 cc 1000 mg × 0 V
⑧	生食シリンジ × 1 筒	

