患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

Sotorasib+Panitumumab療法

1. ソトラシブ： ☐ 960mg/日 ☐ 480mg/日 ☐ 240mg/日

1. パニツムマブ ☐ 初回：6．0mg/kg
☐ 1段階減量：4．8mg/kg ☐ 2段階減量：3．6mg/kg

施行回数： コース

前回実施日：

PS： ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日：

投与方法

初回時のみ、
ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ投与の2～2時間30分前に
ｿﾄﾗｼﾌﾞを内服すること！

①ﾌﾟﾗｲﾐﾝｸﾞ → ②60分 → ③60分/フラッシュ

	薬剤名・投与量		薬剤使用量
①	生食 50ml × 1 B		
②	生食 100ml × 1 B パニツムマブ 0 mg		抜き取り量： 0.0 cc 400 mg × 0 V 100 mg × 0 V ☆インラインフィルターを使用すること！
③	生食 100ml × 1 B		☆初回は60分観察 異常無ければ2回目以降はフラッシュで

day1 day14

ソトラシブ：毎日内服（ソトラシブ休薬時はパニツムマブも休薬）

パニツムマブ

1コース

★初回時のみ、パニツムマブ投与の2～2時間30分前にソトラシブを内服すること！
2クール目以降はパニツムマブ投与前のソトラシブ内服は不要。