

患者ID	&tagPatNo&
氏名	&tagPatKanaName&
生年月日	&tagPatBirth&
年齢	&tagPatage&
性別	&tagPatSex&
身長	&tagPatHeight&
体重	&tagPatWeight&
体表面積	#VALUE!

## エンコラフェニブ+ピニメチニブ+セツキシマブ療法

1. セツキシマブ(2週毎)  500mg/m<sup>2</sup> 減量時:  400  300mg/m<sup>2</sup>

2. エンコラフェニブ:  300  225  150mg/回 (1日1回内服)

3. ピニメチニブ:  45  30  15mg/回 (1日2回内服)

☆セツキシマブによる皮膚障害予防にミノマイシン錠を1日1回100mg内服  
(クラリスは不可! CYP3A阻害によりエンコラフェニブの血中濃度上昇)

主治医 &tagPatOrdDoc&

施行開始日: \_\_\_\_\_

施行回数: \_\_\_\_\_ コース

前回実施日: \_\_\_\_\_

PS:  0  1  2

投与方法

①30分

②120分

③60分

経口: day1夕~連日内服

	薬剤名・投与量	薬剤使用量
①	生食 100ml × 1 B デカドロン 19.8mg ポララミン 5mg × 1 A ガスター 20mg × 1 A	6.6 mg × 3 V
②	生食 250ml × 1 B セツキシマブ <u>0 mg</u>	抜き取り量: <u>0.0 cc</u> 500 mg × 0 V 100 mg × 0 V ☆開始から15分間観察すること (infusion reactionに注意)
③	生食 100ml × 1 B	* 60分観察
経口	エンコラフェニブ <u>300 mg/日</u>	75 mg × 4 錠/1日1回(夕食後)
経口	ピニメチニブ <u>90 mg/日</u>	15 mg × 6 錠/(分2 朝・夕食後)